



LES REFUGES LPO PÉI



Ter là, nou protèz la natir !



FICHE REFUGES

Des Paille-en-queue qui nichent en ville



PRESENTATION DE L'ESPECE

Le **Paille-en-queue à brins blancs** (*Phaethon lepturus*) est un **oiseau marin indigène et protégé** à La Réunion. Il niche habituellement en milieu naturel, utilisant la plupart du temps des **cavités rocheuses** (souvent en falaises), parfois des **trous d'arbres** creux et plus rarement des emplacements directement **au sol**, cachés dans la végétation.

L'espèce possède une **reproduction asynchrone**, c'est-à-dire que tous les couples ne se reproduisent pas au même moment : la **nidification** peut avoir lieu **tout au long de l'année**. Les couples de paille-en-queue ont tendance à être **fidèles** à leur site de reproduction, c'est-à-dire qu'ils reviennent toujours occuper le même nid.

La présence des oiseaux au nid dure environ **4 mois**, à partir du moment où la **ponte** a eu lieu (40 jours d'incubation de l'œuf puis 80 jours d'élevage du poussin avant son envol).

A la fin de leur période de reproduction, ces oiseaux migrateurs **quittent l'île**, parcourant des milliers de kilomètres pour se diriger vers le centre de l'Océan Indien pour une durée de **plusieurs mois**.

DES CAS DE NIDIFICATION EN MILIEU URBAIN

Depuis quelques années, des paille-en-queue sont observés en zones urbaine et périurbaine à La Réunion, **nichant dans des jardins ou directement en pleine rue**, sous les yeux intrigués des habitants. Ce comportement semble tout à fait inédit puisqu'il n'a été documenté nulle part ailleurs dans le monde à notre connaissance !

Afin de l'étudier, l'**opération de sciences participatives "Paille-en-queue la kour"** a été menée dans le cadre du projet **FEDER SMAC** (Seabird Multidisciplinary Applied research for Conservation). L'étude visait à **comparer le succès reproducteur** des couples nichant en milieu **naturel** et en milieu **urbain**. Elle a permis de récolter les données présentées dans ce document.

Ainsi, **si vous êtes témoin d'un cas de ce type, signalez-le au réseau de surveillance « Paille-en-queue la Kour »** via la page Facebook du même nom, ou via les coordonnées indiquées ci-dessous :



AIDER LES PAILLE-EN-QUEUE URBAINS

Ces oiseaux, en adoptant ce comportement, peuvent exposer leurs œufs et poussins à plusieurs **menaces**. Si le nid se trouve dans votre jardin, vous pouvez agir pour les aider :

1. Risque de prédation par les rats ou par les chiens et chats domestiques ou errants :

Vous pouvez mettre en place des actions de **dératisation**, afin de minimiser le risque pour les œufs et poussins. Pour cela, veillez à utiliser des **méthodes spécifiques**, qui ne peuvent pas toucher d'autres animaux que les rats (voir notre **Fiche Refuges – Lutte contre les rats**).

Les **fourmis rouges** (fourmis de feu tropicales) pourraient, elles aussi, poser problème : pour y remédier, on peut épandre de la **terre de diatomée** à distance du nid, si le cas se présente. Concernant les **animaux domestiques**, s'il s'agit de **votre animal**, tentez de le maintenir à distance du nid autant que possible.

Pour les **chiens**, on peut par exemple mettre en place une **clôture temporaire** autour du nid, mais en restant à bonne distance de celui-ci pour **ne pas gêner l'envol et l'atterrissage des adultes**.

Pour les **chats**, cela peut sembler plus compliqué, mais il existe quelques recommandations permettant de **réduire leur instinct de chasseurs** : jouer avec eux régulièrement, bien les nourrir, les garder à l'intérieur durant la nuit (période où ils chassent le plus). Pour plus d'informations à ce sujet, rendez-vous dans votre Espace membre en ligne, et consultez la **Fiche LPO dédiée** !

Ces précautions ne sont à prendre que pour une durée limitée, celle de la présence des oiseaux pour la nidification, qui dure environ 4 mois.

2. Risque de chute du poussin



Crédit : Projet SMAC

Il arrive parfois que **des poussins tombent de leur nid** lorsque ceux-ci sont installés dans des **cavités étroites** (notamment dans des **murs**). En effet, au cours de leur croissance, les poussins ont **besoin d'étendre leurs ailes** régulièrement pour se **muscler** en vue de l'envol. S'ils n'ont pas suffisamment d'espace dans leur nid, ils s'approchent du bord et peuvent chuter. Dans le meilleur des cas ils sont **trouvés** par quelqu'un qui les emmène au centre de soins de la SEOR, sinon ils peuvent être **attaqués** par des chiens ou chats errants, se faire **percuter** par un véhicule, ou bien mourir de **déshydratation**.

En cas de doute sur la sécurité des oiseaux, contactez la SEOR qui vous conseillera au cas-par-cas ! *

ATTENTION AU DERANGEMENT !

Des **passages** ou installations **répétées** à proximité directe du nid risquerait de **stresser les parents**, ce qui pourrait éventuellement causer un **abandon du nid** ! Evitez au maximum d'approcher le nid (limitez votre présence à 3 minutes maximum) pour garantir la **quiétude** des oiseaux dans ce moment crucial de leur vie.

Il est également **inutile de tenter de leur fournir de l'eau ou de la nourriture** : ces oiseaux ne se nourrissent que de poisson qu'ils pêchent en mer et ne boivent pas dans des récipients.

* UN OISEAU EN DETRESSE ?

Si un paille-en-queue adulte ou poussin vous semble dans un état anormal ou blessé, avant d'agir, **contactez au plus vite le centre de soins de la SEOR au 02 62 20 46 65**, qui vous apportera les conseils appropriés en fonction de la situation et organisera si besoin l'acheminement de l'oiseau pour qu'il y soit soigné.

Plus d'informations sur le site de la SEOR - rubrique "Vous avez trouvé un oiseau".



Crédit : Camille Fahrner